

Ringkasan Karakteristik Obat

1. Nama Obat Jadi : SANMOL[®] 500
2. Bentuk Sediaan : Tablet Effervescent
3. Komposisi : Tiap tablet effervescent mengandung :
Parasetamol..... 500 mg
4. Cara Kerja Obat : SANMOL[®] 500 mg tablet effervescent mengandung Parasetamol yang bekerja sebagai analgesik, dengan meningkatkan ambang rasa sakit dan sebagai antipiretik yang diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.
5. Indikasi : SANMOL[®] 500 mg tablet effervescent diindikasikan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.
6. Kontraindikasi :
 - Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
 - Hipersensitivitas terhadap Parasetamol
7. Efek Samping :
 - Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
 - Reaksi hipersensitivitas.
8. Peringatan dan Perhatian :
 - Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi ginjal.
 - Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan.
 - Penggunaan obat pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati
9. Dosis :
Dewasa: 1 tablet, 3-4 kali sehari.
Anak 6- 12 tahun : 1/2 - 1 tablet, 3-4 kali sehari.
Atau sesuai petunjuk dokter
10. Cara Pemakaian :
Larutkan 1 tablet effervescent ke dalam segelas air hangat (\pm 200 ml).
11. Kemasan :
Dus isi 1 tube @10 tablet effervescent

12. Cara Penyimpanan :
Simpan dalam wadah tertutup rapat di bawah suhu 30° C

13. Produsen :
PT CAPRIFARMINDO LABS.
Bandung - Indonesia
Untuk
PT SANBE FARMA
Bandung - Indonesia

SANMOL[®] 500 mg
Paracetamol
Tablet Effervescent

Tiap tablet effervescent mengandung:

Parasetamol.....500 mg

FARMAKOLOGI

SANMOL[®] 500 mg Tablet effervescent mengandung Parasetamol yang bekerja sebagai analgesik, dengan meningkatkan ambang rasa sakit dan sebagai anti piretik yang diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus.

INDIKASI

SANMOL[®] 500 mg Tablet effervescent diindikasikan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam.

KONTRA-INDIKASI

- Penderita gangguan fungsi hati yang berat.
- Hipersensitivitas terhadap Parasetamol.

EFEK SAMPING

- Penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati.
- Reaksi hipersensitivitas.

PERHATIAN

- Hati-hati penggunaan pada penderita gangguan fungsi ginjal.
- Bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan Kesehatan.
- Penggunaan obat pada penderita yang mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati.

DOSIS

Dewasa:

1 tablet effervescent. 3 - 4 kali sehari.

Anak-anak 6 - 12 tahun:

1/2 -1 tablet effervescent, 3 - 4 kali sehari.

Atau sesuai petunjuk dokter.

ATURAN PAKAI

Larutkan 1 tablet effervescent ke dalam segelas air hangat (\pm 200 ml).

KEMASAN

Dus isi 1 tube [®] 10 tablet effervescent

No. Reg.:

PENYIMPANAN

Simpan dalam wadah tertutup rapat di bawah suhu 30°C.

Dibuat oleh : **PT CAPRIFARMINDO LABS.**

Bandung - Indonesia

Untuk : **PT SANBE FARMA**

Bandung Indonesia

SANMOL[®] 500 mg

Paracetamol

Tablet Effervescent

Each effervescent tablet contains :

Paracetamol.....500 mg

PHARMACOLOGY

SANMOL[®] 500 mg Effervescent Tablet contain Paracetamol which acts as an analgesic by increasing pain threshold and as an antipyretics by direct action on the hypothalamic heat regulating center.

INDICATIONS

SANMOL[®] 500 mg Effervescent tablet is indicated for relief of pain, under conditions of headache, toothache and fever

CONTRA-INDICATIONS

- Patients with severe hepatic dysfunctions.
- Hypersensitivity reactions to Paracetamol.

ADVERSE REACTIONS

- Prolonged use and overdesage may cause liver damage.
- Hypersensitivity reactions.

PRECAUTIONS

- Should be used with caution in patients with renal dysfunctions.
- Consult to Health Service Unit if fever persists for more than 2 days or if pain continues for more than 5 days.
- The use of drug in patients consuming alcohol may increase the risk of liver damage.

DOSAGE

Adult:

1 effervescent tablet. 3 - 4 times daily.

Children 6-12 years:

1/2 -1 effervescent tablet, 3 - 4 times daily.

Or as directed by the physician.

DIRECTION FOR USE

Dissolve 1 effervescent tablet into a glass of warm drinking water (\pm 200 ml).

PRESENTATION

Box of 1 tube @ 10 effervescent tablets

Reg. No.:

STORAGE

Keep in tight container at temperature below 30°C.

Manufactured by : **PT CAPRIFARMINDO LABS.**

Bandung - Indonesia

For : **PT SANBE FARMA**

Bandung Indonesia